

## Directive du District scolaire francophone du Nord-Ouest

### DIRECTIVE 5.08

Page 1 de 3

Objet : **Plan d'urgence pour la gestion du diabète de type 1 à l'intention des chauffeurs d'autobus scolaire**

En vigueur : **juin 2015**

Révision :

#### **1. Application :**

Cette directive s'applique à tous les chauffeurs d'autobus du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

#### **2. Définitions :**

**2.1 Le diabète de type 1:** est causée par une réaction auto-immune où le système de défense du corps attaque les cellules productrices d'insuline. Les personnes atteintes de diabète de type 1 produisent très peu ou pas d'insuline. La maladie peut affecter des personnes de tout âge, mais survient généralement chez les enfants ou les jeunes adultes. Les personnes atteintes de cette forme de diabète ont besoin d'injections d'insuline tous les jours afin de contrôler les niveaux de glucose (sucre) dans le sang.

#### **3. But :**

Il est possible, grâce à un plan d'urgence pour la gestion du diabète de type 1, de rendre un milieu sécuritaire. Les plans de prise en charge du diabète de type 1 à l'école contribuent à réduire les risques et à préparer le milieu scolaire aux interventions d'urgence. Il est essentiel d'être en mesure d'intervenir rapidement et efficacement.

Les chauffeurs d'autobus scolaire doivent:

- être renseigné et conseiller sur ce qu'est le diabète de type 1;
- connaître les étapes à suivre au premier signe d'une réaction d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie;
- connaître le rôle de chacune des parties impliquées (chauffeur, école, ambulancier).

Objet : **Plan d'urgence pour la gestion du diabète de type 1 à l'intention des chauffeurs d'autobus scolaire**

En vigueur : **juin 2015**

Révision :

#### 4. Lignes directrices :

##### 4.1 Hypoglycémie Diminution du taux de sucre dans le sang:

###### 4.1.1 Si l'élève est CONSCIENT :

- Si possible, demandez à l'élève de mesurer sa glycémie.
- Si ce n'est pas possible ou si la glycémie est moins de 4 mmol/l
  - **donnez immédiatement du sucre à effet rapide**, ( ex. : comprimés de glucose à action rapide Dex **ou** 3 sachets de sucre **ou** l'équivalent fournis par le parent);
- Appelez à l'école et suivez les recommandations **ou** attendez de 5 à 10 minutes et prenez une nouvelle mesure de la glycémie;
- **Répétez le traitement** si les symptômes persistent ou si la glycémie est toujours moins de 4 mmol/l;
- Dès que la glycémie s'établit à 4 mmol/l, permettre à l'enfant de prendre une collation, si possible.

###### 4.1.2 Si l'élève est INCAPABLE D'AVALER OU EST INCONSCIENT

- Appelez le **SERVICE 911**
- Ne tentez pas de lui donner quelque chose par la bouche. Tournez l'élève sur le côté (si possible).
- Vérifiez la glycémie si possible; si elle est moins de 4 mmol/l ou si ce n'est pas possible de la vérifier: administrez **le glucagon\*** tel que prescrit:
  - moins de 44 lb (20 kg) : la moitié de la seringue
  - 44 lb (20 kg) : la seringue au complet
- Déconnectez la pompe à insuline (si l'élève en a une);
- À l'arrivée des services d'urgence, remettre le vial de glucagon qui a été utilisé. Aviser de l'heure de l'administration, du site et de la dose administrée;

---

Objet : **Plan d'urgence pour la gestion du diabète de type 1 à l'intention des chauffeurs d'autobus scolaire**

En vigueur : **juin 2015**

Révision :

---

- Même si l'état de l'élève se stabilise, il doit être accompagné à l'hôpital par les services d'urgence.
- Contacter l'école et la personne responsable des transports au District scolaire francophone du Nord-Ouest.

\*Le Glucagon doit seulement être administré si prescrit dans le plan. Seulement le personnel formé devrait administrer le Glucagon.

#### **4.2 Hyperglycémie Augmentation du taux de sucre dans le sang**

##### **4.2.1 En cas d'hyperglycémie accrue (somnolence, nausée ou vomissements), le chauffeur d'autobus scolaire doit :**

- confirmer l'hyperglycémie en vérifiant le taux de sucre dans le sang, si possible;
- si l'élève vomit et que sa condition se détériore, **appeler le SERVICE 911.**